수클리어®산 대장내시경 장정결제 복약 안내문

대장내시경 전 주의해야 할 음식

검사 3일 전부터 ~ 2일 전까지

피할 음식

잡곡밥, 검은쌀, 콩나물밥, 현미밥, 깨죽, 녹두죽, 잣죽, 고춧가루, 참기름, 들기름 등...



배추김치, 열무김치, 파김치, 얼갈이, 우거지, 콩나물, 고사리, 도라지, 미나리, 미역, 김, 설렁탕, 곰탕, 삼겹살, 고구마, 사과



씨 있는 과일 (수박, 참외, 딸기, 포도, 토마토, 키위, 메론 등)
고추씨, 옥수수, 견과류 (땅콩, 잣, 호두)



드실 수 있는 음식

흰쌀밥, 흰죽만 가능



계란류, 두부류, 묵, 생선류, 국물류, 빵종류, 음료류(탄산음료, 맑은 쥬스, 우유, 커피, 녹차 등), 감자, 바나나



검사 전날

- 아침, 점심 : 반찬없이 흰쌀 죽
  : 식사는 오후 2시 이전에 끝내시고 물은 충분히 드세요.



대장내시경 검사 전 자가진단 (변 색깔을 비교해보세요)

정확한 검사를 위해서는 장을 깨끗이 비우는 것이 매우 중요합니다.

The American Journal of Gastroenterology 2011;106:875-883





수클리어®산 대장내시경 검사 안내문

정확한 대장내시경 검사를 위해 아래와 같은 주의사항을 꼭! 지켜 주셔야 합니다.

_____ 님의 검사 시간은
____월 ____일 ____시 ____분입니다.

복용법

1차 복용 ▶

☐전날 ☐당일
☐오전 ☐오후

_____일
____시 ____분



수클리어®산 1포를 동봉된 용기에 넣고 적량의 물을 가하여 용해시킵니다.



용기의 표시선 (473ml) 까지 물을 붓고 잘 흔들어 섞습니다.



혼합된 용액을 천천히 나누어 모두 마십니다.



이후, 표시선 (473ml) 까지 물을 채워 두 차례 추가로 마십니다.

2차 복용 ▶

☐전날 ☐당일
☐오전 ☐오후

_____일
____시 ____분



수클리어®산 1포를 동봉된 용기에 넣고 적량의 물을 가하여 용해시킵니다.



용기의 표시선 (473ml) 까지 물을 붓고 잘 흔들어 섞습니다.



혼합된 용액을 천천히 나누어 모두 마십니다.



이후, 표시선 (473ml) 까지 물을 채워 두 차례 추가로 마십니다.

※ 적어도 검사 2시간 전 또는 의사가 지시한 시간까지 이 약 복용 및 추가 물 섭취를 완료합니다.

복용시 주의사항

- 심장질환이나 신장질환, 천식, 만성폐질환, 고혈압, 협심증, 당뇨 등으로 현재 약물을 복용 중이거나 인슐린 주사를 맞고 계시는 분은 사전에 상담 바랍니다.
- 현재 복용 중인 처방 약물 중 항응고제(와파린, 헤파린)나 항혈전제(아스피린, 플라빅스) 관련 약을 복용하시는 경우, 미리 말씀하여 주십시오.
- 고혈압이나 심장질환으로 약을 드시는 분은 검사 당일 아침에 소량의 물과 함께 약을 드십시오. 혈당 조절 약물이나 인슐린 주사는 투여하지 마십시오.
- **장 정결 상태가 불량할 시에는 검사가 제대로 진행되지 못할 수도 있으므로 안내 받으신 대로 모두 복용하셔야 검사가 가능합니다.**